

L'EGDS ovvero esofagogastroduodenoscopia è un esame che consente di valutare l'esofago, lo stomaco ed il duodeno con una sonda flessibile che viene introdotta dalla bocca.


INDICAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI CIBO/LIQUIDI:
• Esame programmato entro le 14:00:

Il giorno che precede l'esame, fare una cena leggera alle ore 20:00 e poi non assumere più altri cibi solidi. Non è consentita la colazione il giorno dell'esame. È possibile bere acqua in piccoli sorsi per assumere l'abituale terapia farmacologica fino a massimo 3 ore prima dell'esame.

• Esame programmato dopo le 14:00:

È consentita una colazione leggera alle ore 7:00 (esempio: the o camomilla+ fette biscottate; evitare caffè) e poi non assumere più altri cibi solidi. È possibile bere acqua in piccoli sorsi per assumere l'abituale terapia farmacologica fino a massimo 3 ore prima dell'esame.

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI FARMACI ANTIAGGREGANTI/ANTICOAGULANTI


Durante l'esame, potrebbe essere necessaria l'esecuzione di biopsie, ovvero il prelievo di un frammento di mucosa.

In previsione di tale procedura se si sta assumendo:

- **Cardioaspirina:** non è necessaria la sospensione.
- **Clopidogrel, Ticagrelor, Prasugrel** (es. **Plavix, Brilique, Efient**): non è necessaria la sospensione
- **Terapia combinata con cardioaspirina + clopidogrel** (es. **duoplatin**): valutazione cardiologica per la gestione.
- **Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, Edoxaban** (es. **Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana**): non assumere la dose il giorno dell'esame.
- **Warfarin, Acenocumarolo (Es. Coumadin, Sintrom):** valutazione cardiologica per la gestione.

ALTRE INFORMAZIONI:

	<ul style="list-style-type: none"> • Per i pazienti affetti da cirrosi epatica, patologie ematologiche o che assumono Coumadin/sintrom, portare con sé esami ematici ovvero emocromo, aptt/pt/inr. • Portare con sé eventuali esami precedenti (esami endoscopici, radiologici e/o il referto della visita gastroenterologica). • Se si è portatori di protesi dentaria mobile, portare con sé un contenitore in cui riporre la protesi. Per l'esecuzione della EGDS le verrà infatti chiesto di togliere la protesi dentaria mobile.
	<p>La mattina dell'esame la terapia abituale (ad esempio per ipertensione arteriosa-aritmie o altro) può essere regolarmente assunta</p> <p>Non assumere sciroppi la mattina dell'esame.</p> <p>Per i pazienti diabetici è consigliato controllare la glicemia prima di recarsi in ospedale e tener conto del digiuno per la somministrazione dell'abituale terapia ipoglicemizzante.</p>
	<p>È necessario venire accompagnati. La somministrazione dei farmaci per la sedo-analgesia può ridurre i riflessi e l'attenzione; pertanto è vietato mettersi alla guida nelle 12 ore successive alla procedura.</p>